

WEED CONTROL

CONTROL DE MALEZA DE HOJA ANCHA

- Controls dandelions and 200 other broadleaf weeds Controla los dientes de león y 200 otras malezas de hoja ancha
- Will not burn your lawn
 No quemará su césped
- Apply in spring or fall Aplicar en primavera u otoño



COVERS 5,000 SQ. FT. Net Wt. 10 lbs. (4.54 kg) Reco noto: 4.54 kg (10 lb).

Does not contain fertilizer No contiene fortilizante

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS See back panel for Precautionary Statements. Consulte el panel posterior para viras medidas de precaución.

ACTIVE INGREDIENTS: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. 1.37% Ácido 2,4-dichrofenoxiacético (+)-(R)-2-(2 methyl-4-chlorophenoxy)

THIS PRODUCT CONTAINS: 27.4 lbs. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent 6.2 lbs. (+)-(R)-2-(2 methyl-4-chlorophenoxy) propionic acid equivalent per ton. 2.6 lbs. 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per ton. 1,1 kg (2,6 lb) de ácido 3,6 dicloro-o-anisico Isomer Specific by AOAC Methods. Contains the single isomer form of Mecoprop-p.

. 0.31% -2-(2 metil-4-clorofenoxi) . . . STOP! READ THE ENTIRE LABEL FIRST. OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.

Directions for Use It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

PRECAUTIONS AND RESTRICTIONS: • Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. Do not allow people or pets to enter the treated area until dusts have settled. • Apply when the air is calm. Do not apply to newly seeded lawns. Do not exceed specified dosages for any area. During application, close . Do not use this product on or near desirable plants, including within the drip line of the roots of desirable trees and shrubs, since injury may result • Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers, or drainage ditches. Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays, and oceans. Do not apply when windy. Apply this product directly to your lawn, and sweep any product landing on the driveway, sidewalk, gutter, or street back onto the treated area. To prevent product run-off, do not over water the treated area(s) to the point of runoff or apply when raining or when rain is expected that day.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal. feed, seeds or other pesticides. PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Non refillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer if recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Do not allow the material to drift onto flowers, vegetables or ornamental shrubbery. Apply when the air is calm. Do not apply to newly seeded lawns. Do not apply in areas underlaid by roots of desirable trees and shrubs. Do not exceed specified dosages for any area; be particularly careful within dripline of tree and other ornamental species. During application, close spreader openings when turning. Do not contaminate domestic or irrigation waters. Do not use this product on or near desirable plants, including within the drip line of the roots of desirable trees and shrubs, since injury may result. Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers or drainage ditches. Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays and oceans. Do not apply when windy. Apply this product directly to your lawn and sweep any product landing on the driveway, sidewalk, gutter or

S

RS

0

Preen Lawn Broadleaf Weed Control controls a wide range of lawn weeds including dandelion, chickweed, knotweed, plantain, henbit, spurge and many others commonly found in home lawns. Possible retreatment may be necessary if (a) lawn is heavily overrun by weeds, or, (b) if adverse low moisture conditions prevail and weeds are in a state of poor growth. A second application may be made in approximately 30 days. For use on established turf of warm season grasses includes bermudagrass, centipedegrass, and

Cyclone® Rotary Earthway® Rotary Established turf of cool season grasses includes Kentucky bluegrass, perennial ryegrass, tall fescue, and Greenview® Jet-Spred® SS1 turf-type tall fescues. Do not apply this product on carpetgrass, dichondra, St. Augustinegrass, or established turf containing desirable clovers.

The maximum broadcast application rate is 2.0 pounds of product per 1,000 sq.ft. per application. The maximum number of broadcast applications is limited to 2 per year with a minimum of 30 days between applications. The maximum seasonal rate is 4.0 pounds of product per 1,000 sq.ft.

1. Mow lawn to normal height 1 to 2 days before application. 2. Water lawn thoroughly at least 1 day before application to sustain moisture 3. Apply when weeds are young and actively growing, preferably in the morning when dew is on the grass. If grass is not moist at the time of application, sprinkle lightly with water to allow the granules to adhere and to remain on the leaf surface of the weeds.

application may cause injury to your lawn. Spreader settings are approximate.

Differences may occur due to condition of spread, speed at which applied and roughness of area treated. Be sure to check spreader before beginning, adjusting if necessary. Consult The spreader settings are approximate. Calibrate your spreader on 100 sq. ft. and adjust to apply at the rate of 1 lb. of product per 500 sq. ft. (2 lbs. of material per 1,000 sq. ft.). Rate of walk, moisture and spreader condition can vary the spreader setting necessary to apply the correct amount.

Broadcast Spreaders - Apply in a single pass at a rate of 2 lbs. per 1,000 sq. ft. Start on the outside border and apply in a circular path working toward the center. Overlap the coverage slightly, and shut off spreader before making hard turns. If your spreader model does not appear, go to our website at www.preen.com, or call toll-free

(800) 233-1067, 8 A.M. - 5 P.M. EDT, Monday - Friday, for additional model settings.

Austrian fieldcress
Bedstraw
Beggarticks
Betony, Florida
Bindweed, field
Bird vetch
Bitter wintercress
Bittercress, hairy
Bitterweed
Black-eyed Susan
Black medic
Black mustard
Blackseed plantain
Blessed thistle
Bloodflower milkwee
Blue lettuce
Blue vervain
Bracted plantain
Bristly oxtongue
Broadleaf dock
Broadleaf plantain
Bromweed
Buckhorn
Buckhorn plantain
Bulbous buttercup
Bull thistle
Bullnettle
Bullnettle
Burlclover
Burdock
Burning nettle
Burweed
Buttercup
Buttonweed
Canada thistle
Carolina geranium
Carpetweed
Carlona geranium
Carpetweed
Catchweed bedstraw
Catnip
Catsear
Chickweed: common,
mouseear
Chicory
Cinquefoil
Clover: crimson,
hop, red, strawberry,
sweet, white
Cockle

Warranty
The distributor warrants that this product conforms to its chemical

description and is reasonably fit for the purpose stated on the label

when used in accordance with directions under normal conditions of

use, but neither this warranty nor any other warranty of

implied, extends to the use of this product contrary to label

any such use.

merchantability or fitness for a particular purpose, expressed or

instructions, or under abnormal conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to distributor, and buyer assumes the risk

Wild marigold
Wild mustard
Wild onion
Wild parsnip
Wild radish
Wild rape
Wild strawberry
Wild sweet potato
Wild vetch
Woodsorrel
Woolly croton
Woolly plantain
Wormseed
Yarrow
Yellow rocket
Yellowflower
pepperweed
& other broadleaf weeds

Trébol de olor amarili Áster
Galio de radícula aus Amor seco
Estáquida de Florida Correhuela
Veza de pájaro
Hierba de Santa Bárt amarga halry Bitter Hierba amarga pelur Rudbeckia
Lupulina
Mostaza negra
Plantago rugelii Cardo thistle bendito Flor de sanç Lechuga azul Blue vervain Bracter Verbena azul Planta patagónico
Raspasayos
Lengua de vaca Llantén Escobilla Cholla espinosa Llantén Escobilla Cholla espinosa Llantén peludo Hierba velluda Cardo común Solano de Carolina Trébol de carretilla Bardana Ortiga brava Cadillo Botón de oro Hierba de botón Cardo negro Geranio silvestre de Culantrillo Amor de hortelano Hierba gatera Hierba del halcón Pamplina: común, o Achicoria Cincoenrama Trébol: encarnado, a rojo, fresa, de olor Cizaña Cardo ajonjonero Verbasco PREEN GUARANTEE satisfied with the performance of this product when used as directed, or your money back. If not satisfied, describe the nature of your problem, and send with proof of purchase to:

Lebanon Seaboard Corporation guarantees you will be Lebanon Seaboard Corporation le garantiza que, si usted no gueda reembolsará su dinero. Si no está satisfecho, describa la naturaleza de su problema y envíelo con el comprobante de compra a: LEBANON SEABOARD CORPORATION 1600 EAST CUMBERLAND STREET, LEBANON, PA 17042

AVISOS DE PRECAUCIÓN

- FIRST AID

CAUTION: Harmful if absorbed through skin. Harmful if inhaled. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Avoid breathing dust. Causes moderate eye irritation. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Wear long-sleeved shirt and long pants, socks, shoes and gloves. Remove and wash

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

 Take off contaminated clothing.
 Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. OR CLOTHING: Call a poison control center or doctor for treatment advice. container or label with Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or ambulance, then give IF INHALED: artificial respiration, preferable mouth-to-mouth, if possible. Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. toll free (888) 208-1368. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.
 Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Environmental Hazards This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates and may adversely affect non-target plants. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk or street back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

(L) (D) EPA Est. 961-PA-01:961-IL-01 EPA Reg. No. 2217-640-961 Superscript used is first letter of lot number.

El super/indice usado es la primera letra del número de lote. Instrucciones de uso

LAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE.

Es una violación a la ley federal utilizar este producto de manera contraria a lo establecido en la etiqueta. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES: No aplique el producto de ninguna manera en que pueda entrar en contacto con personas o mascotas, ya sea directa o
indirectamente. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación. No permita que las personas o • Aplique cuando el aire esté calmo. No lo aplique sobre céspedes recién sembrados. No exceda la dosis indicada para ningún área. Cierre las aberturas del esparcidor al rotarlo durante la aplicación.

DETÉNGASE! LEA LA ETIQUETA COMPLETA PRIMERO. CUMPLA CONTODAS LAS PRECAUCIONES Y SIGA

No use este producto en plantas deseadas o cerca de ellas, incluida la línea de goteo de las raíces de los árboles y arbustos deseados, ya que puede provocar daños. No lo aplique directamente en el agua, desagües de aguas pluviales, canaletas, cloacas o zanjas ni cerca de éstos. No lo aplique a menos de 7,62 metros de ríos, estanques de peces, lagos, arroyos, embalses, pantanos, estuarios, bahías y océanos. No lo aplique bajo condiciones de viento. Aplique este producto directamente en el césped y barra el producto que caiga sobre la entrada de garaje, la acera o la calle llevándolo de vuelta al césped. Para evitar que el producto escurra, no

rieque en exceso las áreas tratadas ni aplique cuando esté lloviendo o cuando se esperen lluvias dentro del día.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN No contamine el agua, los alimentos o el forraje al almacenarlo o eliminarlo ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Conserve en el envase original en un área fresca, seca y alejada del calor extremo y la luz solar directa. No almacene cerca de alimentos, semillas u otros pesticidas. ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE: El envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni rellene este envase. Si está vacío: Colóquelo en la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca deseche el producto sin usar en desagües en interiores o exteriores

Precauciones de uso lo aplique sobre céspedes recién sembrados. No aplique en áreas en las que haya raíces de árboles y arbustos de su agrado. No exceda las dosis indicadas para cada área; sea especialmente cuidadoso en la línea de riego de los árboles y otras especies ornamentales. Cierre las aberturas del esparcidor al rotarlo durante la aplicación. No contamine las aguas domésticas o de irrigación. No use este producto en plantas deseadas o cerca de ellas, incluida la línea de goteo de las estanques de peces, lagos, arroyos, embalses, pantanos, estuarios, bahías y océanos. No lo aplique bajo condiciones de viento. Aplique este producto directamente en el césped y barra el producto que caiga sobre la entrada de garaje, la acera o aplicarán en caso de lluvia o cuando se espera que llueva ese día. Setting

lunes a viernes de

muchas otras que a menudo se encuentran en el césped de las casas. Podría ser necesario un nuevo tratamiento si (a) el césped está excesivamente invadido por están en un período de crecimiento pobre. Se puede realizar una segunda aplicación en aproximadamente 30 días. Lesco® Rotary (dial A-S)/(number dial) G /15 Para su uso en tepes establecidos de estaciones cálidas, incluyendo césped Bermuda, résped ciempiés y césped zoysia. Tepes establecidos de estación fría, incluyendo césped azul de Kentucky, festuca alta y festucas altas tipo tepe. No aplique este producto sobre césped alfombra, oreja de ratón, césped San Agustín o tepes establecidos con tréboles que sean de su agrado. Scotts® SpeedyGreen® 2000, 3000

Instrucciones

Vigoro® Rotary (1-10) Drop Spreaders Esparcidores por voleo Agri-Fab® Drop Greenview® Drop-Spred® XP1 Red Devil® Drop (1-5) Republic® Drop Scotts® Drop AccuGreen® (2-18) Scotts® Drop PF1 (2-18)

Broadcast Spreaders

Agri-Fab® Rotary

Republic® Rotary

Scotts® EasyGreen®

Scotts® EdgeGuard®

True Temper® Rotary

Sta-Green® Drop (1-5)

Red Devil® Rotary (1-20)

Sears® Craftsman Rotary Sta-Green® Rotary (1-10)

Esparcidor por dispersión

La dosis máxima de aplicación es de 0,91 kg de producto por cada 92,90 m² por La cantidad máxima de aplicaciones por dispersión se limita a 2 por año, con un mínimo de 30 días entre aplicaciones. La dosis máxima por temporada es de 1,81 kg Riegue bien el césped al menos 1 día antes de la aplicación para mantener la humedad hasta el siguiente riego (consulte el paso 4). adhieran y se mantengan en la superficies de las hojas de las malezas. I. No moje las hojas de las malezas por 1 ó 2 días después de la aplicación. Tras ese

controlador de malezas de hoja ancha de césped Preen, controla una gran variedad

aplicar más de lo debido podría dañarlo. Las graduaciones del esparcidor son aproximadas.

Se pueden producir diferencias debido a las condiciones de la esparsión, la velocidad con la que se aplica y la escabrosidad del área tratada. Asegúrese de revisar el esparcidor antes de comenzar y haga ajustes de ser necesario Consulte el Manual del propietario. Nunca aplique manualmente. de 0,45 kg de producto por cada 45,45 m² (0,91 kg de material por cada 92,90 m²). El índice de caminatas, humedad condición del esparcidor puede hacer variar las graduaciones necesarias para la aplicación de la cantidad correcta. Esparcidores por dispersión: Aplique en una sola pasada a una relación de 0.91 kg por cada 92.90 m². Comience en e

e y apague (sparcidor no	el esparcidor antes de hacer g o aparece, visite nuestro sitio V	ante hacia arias a lo largo del ces iros difíciles. Veb www.preen.com o llame gratis para conocer graduaciones adicior	al (800) 233-1067, de	
illo anual	Hierba de la moneda Siempreviva	Vellosilla anaranjada Guisaso de caballo	Ortiga mayor Fresa de la India	
ustríaca	Romaza	Jocoyote	Ortiga verde	
aotriaoa	Margarita: Inglesa, mayor	Alquimila arvense	Verbena lila	
a	Erigeron annuus	Chirivía	Hierba de Santiago	
	Diente de león	Clavelito antártico	Pamita	
	Oreja de ratón	Mostacilla	Polígono anfibio	
baram	Manzanilla loca	Lepidio	Cardo	
rweed	Acaricoba	Bledo	Coronilla varia rastrera	
ıda	Falso diente de león	Galio del bosque	Nabón	
	Alegría falsa	Bella Diana	Bledo blanco Malva amarilla	
	Girasol falso Ortiguilla	Plantago	Flor de una hora	
	Ipecacuana de Florida	Ḥiedra venenosa	Hierba de botón de Virginia	
	Carraspique	Árbol de las pulgas	Enredadera de Virginia	
	Albahaca silvestre	Hierba carmin	Lentejilla	
gre	Vara de oro	Diodia teres Walter	Cardo de hoja ondulada	
d plantain	Hierba rastrera	Girasol silvestre	Clemátide	
d plantain	Grindelia	Escarola	clematis	
ago	Rama negra Vellosilla	Afata hembra Sanguinaria postrada	occidental Salsifí occidental	
	Hierba del carpintero	Bledo rastrero Golondrina	Mostaza blanca	
	Golondrina	postrada	Áster silvestre	
	Áster común	Verbena bracteata Roseta	Enredadera anual	
	Correhuela mayor	francesa	Zanahoria silvestre	
	Erísimo	Verdolaga Ambrosía común	Dondiego silvestre	
	Ortiga muerta	Escoba de amargosa	Ajo del oso	
	Mastuerzo oriental	Yuyo colorado	Geranio manchado	
	Llantén medio	Alfilerillo	Lechuga silvestre	
	Verbena stricta	Potentilla norvegica	Chinchilla	
	Solano americano	Erigeron strigosus	Mostaza silvestre	
	Higuera loca	Amaranto	Cebolla silvestre	
	Escleranto (Flor de Bach)	Cardo ruso	Chirivía silvestre	
	Lengua de pájaro	Pimpinela escarlata	Rabizón	
	Pinillo	Cardo borriquero	Rabaniza	
Carolina	Cenizo Trébol de los prados	Acederilla Bolsa de pastor Llantén delgado Albahaca	Fresa silvestre	
e Carolina	Malva	silvestre de flores pequeñas	Camote silvestre Vicia	
	Lippia	Romaza suave	Acedera menor	
	Caperonia	Cenizo suave	Hierba de cabra	
	Astrágalo	Sorrel	Rosa de madera hawaiana	
erastio	Dondiego de día	Cerraja	Ispágula	
	Velosilla oreja de ratón	Bidente Verónica	Santónico	
	Artemisa pegajosa	Bledo espinoso	Milenrama	
marillo,	Cardo pendiente	Cepa caballo	Berro silvestre	
, blanco	Mostaza	Cerraja espinosa	Mastuerzo de flor amarilla y	
	Llantén de hoja estrecha	Hierba del chancho	otras malezas de hoja ancha	
	Algarroba	Hierba de las golondrinas	•	

PRECAUCIÓN: Nocivo si se absorbe por la piel. Nocivo si se inhala. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evite respirar el polvo. Provoca una irritación moderada de los ojos. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el inodoro. Use camisa de mangas largas y pantalones largos, medias, zapatos y guantes. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

SI ESTÁ EN LA PIEL O en la Ropa:	LA ROPA: • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento			
SI SE ASPIRA:	Lleve la persona a un lugar con aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento	tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto		
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:	Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si lleva lentes de contacto puestos, quíteselos luego de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento	Para obtener informa adicional en caso de emergencia, llame g al (888) 208-1368.		
SI SE INGIERE:	Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua. No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos. Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.			

Peligros para el medio ambiente

Este pesticida es tóxico para los peces e invertebrados acuáticos y puede tener efectos adversos en plantas que no eran el objetivo del tratamiento. Para proteger el medio ambiente, no deje que el pesticida entre o escurra hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, alcantarillas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo, cuando no haya pronóstico de lluvia durante las siguientes 24 horas, ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle llevándolo de vuelta al área tratada del césped o jardín para evitar que escurra hacia aguas superficiales o sistemas de desagüe. Este producto químico tiene propiedades y características asociadas con agentes químicos detectados en agua del subsuelo. El uso de este producto químico en áreas donde el suelo es permeable, specialmente donde las napas de agua son de poca profundidad, puede ocasionar contaminación del agua del subsuelo. La aplicación alrededor de una cisterna o pozo puede ocasionar contaminación del agua potable o agua del subsuelo.